

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 12 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DU MIDI (Tél. 52.73.20)

(ARIÈGE, HAUTE-GARONNE, GERS, LOT, HAUTES-PYRÉNÉES,
TARN, TARN-ET-GARONNE)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. 11, rue de la Pleau - TOULOUSE.

C. C. P. : TOULOUSE 8614-19

Abonnement
annuel - 15 F.

Supplément n°1 au Bulletin n°56

- A V E R T I S S E M E N T S -

ARBRES FRUITIERS

- TAVELURES DU POIRIER ET DU POMMIER :

Bien qu'ils soient déjà fortement diminués, les risques de contaminations par les projections d'ascospores persistent encore, notamment en ce qui concerne la Tavelure du poirier. En conséquence, il y aurait intérêt à effectuer un nouveau traitement dès réception.

- CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

Les adultes sont apparus depuis quelques jours mais il est encore trop tôt pour effectuer une application. Attendre pour le faire un prochain bulletin.

- TORDEUSE ORIENTALE DU PECHER :

Des oeufs ont déjà été déposés et les attaques sur pousses vont être visibles dans les jours à venir. En pépinière, un traitement pourrait être utilement appliqué en fin de semaine avec un produit à base de Mévinphos à raison de 50 grammes de matière active à l'hectolitre.

V I G N E

- VERS DE LA GRAPPE :

Le premier vol de *Cochylis* et d'*Eudémis* est commencé depuis une dizaine de jours. Les premières éclosions de jeunes chenilles devraient se produire incessamment. Dans les vignes habituellement sujettes aux attaques, un traitement avec un produit de type préventif devrait être mis en place dès réception.

Si l'on préfère employer un produit de type curatif, on peut attendre le début de la semaine du 24 au 30 Mai.

- BLACK-ROT :

Les toutes premières taches sont apparues à partir du 14 Mai et les sorties vont se poursuivre au cours des jours à venir. Dans les foyers, il y aurait intérêt à couvrir la végétation à l'approche de toute menace de pluie.

- MILDIU :

A ce jour, aucun foyer n'a été découvert à notre connaissance. S'il y en a, consécutifs aux pluies des 1er et 2 Mai, ils doivent être rares et d'importance réduite. En outre, les températures élevées et la sécheresse sont défavorables au champignon. En conséquence, il n'est pas utile de traiter actuellement mais il est bon de continuer à supprimer les repousses inutiles de la base des souches.

- I N F O R M A T I O N S -

- ROUILLE DU PRUNIER ET CARPOCAPSE DES PRUNES :

Contre la Rouille, appliquer avant la prochaine période pluvieuse un produit à base soit de Zinèbe, soit de Zirame. Dans les vergers ayant subi de fortes

581

attaques de Carpocapse des prunes l'an dernier, on pourrait ajouter au fongicide un produit à base d'Ester phosphorique.

CULTURES LEGUMIERES

MELON :

On constate parfois le flétrissement anormal de jeunes plantes. Nous adresser des échantillons fraîchement récoltés et placés non mouillés dans un sachet en matière plastique lui même enfermé dans un emballage résistant.

Ce mode d'emballage est d'ailleurs recommandable pour tout échantillon végétal expédié pour identification.

GRANDES CULTURES

On constate actuellement d'importantes attaques de divers insectes : Phytonomes, Apions, Sitones et Négril. On pourrait effectuer un poudrage insecticide dès la fauche terminée et après le ramassage du fourrage

TOULOUSE le 17 MAI 1965

Les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles;

J. BESSON - E. JOLY

L'Inspecteur
de la Protection des Végétaux

L. IMBERT